

Navodila po vstavitvi implantatov

Vedno si zapomnite, da se čista in zdrava ustna votlina celi hitreje kot zanemarjena.

1. Poskrbite, da boste pili tople in ne vročih napitkov, dokler lokalna anestezija ne popusti.
2. Prvi teden po operaciji si štirikrat dnevno spirajte usta z ustno vodo Curasept z 0.2 % clorheksidina.
3. Pričakujte, da bo prisotne nekaj otekline okrog operativnega mesta, in če je bila operacija v zgornji čeljusti, bo verjetno nekaj otekline tudi pod očmi. Da se temu izognete, si prva dva dni hladite področje operacije s hladnimi obkladki ali ledom, ki jih držite na obrazu in počivajte leže z višjim vzglavjem.
4. Če vam je kirurg predpisal antibiotike, jih v celoti porabite.
5. Vzemite protibolečinske tablete, še preden popusti lokalna anestezija in jih jemljite še nekaj dni. Pazite, da ne prekoračite maksimalnega dovoljenega dnevnega odmerka zdravila.
6. Rahlo krvavenje iz rane je normalno. Če krvavenje ne popusti, s sterilno gazo dvajset do trideset minut izvajajte pritisk na mestu rane in če je potrebno, postopek ponovite.
7. Če imate kakršnekoli skrbi ali vprašanja o vašem pooperativnem stanju, brez obotavljanja pokličite vašega zobozdravnika.